

ALLEGATO

raccolta fino ad inizio allegazione, in pre-emergenza delle infestanti.  
 I trattamenti effettuati dalla fine caduta petali fino ad inizio allegazione sono ammessi solo mediante l'impiego di attrezzature schermate.

**Frutta a guscio (Mandorlo, Nocciolo, Castagno, Nocco, Pistacchio):** 3 l/ha da post-raccolta fino ad inizio allegazione, in pre-emergenza delle infestanti. Non impiegare in terreni sabbiosi.  
**Vite (uve da vino e da tavola):** 3 l/ha da post-raccolta fino a bottoni forati separati, in pre-emergenza delle infestanti. Non impiegare in terreni sabbiosi.

**Fragola:** 3 l/ha in pre-trapianto o, durante il periodo invernale, in post-trapianto tra le file. Non impiegare in terreni sabbiosi.

**Patata:** 3 l/ha in pre-emergenza

**Carota:** 2,5 l/ha in pre-emergenza o post-emergenza (3-4 foglie).

**Aglio, Scalogno, Cipolla (seminata e trapiantata), Porro:** 2,5 l/ha in pre-trapianto (fino a un giorno prima), in pre-emergenza o in post-emergenza/post-trapianto (2-4 foglie).

**Pomodoro, Melanzana, Peperone, Melone:** 2,5 l/ha in pre-trapianto.

**Cavoli (Cavoli a testa, Cavoli a infiorescenza, Cavoletti di Bruxelles),** 2,5 l/ha in pre-trapianto

**Lattughe, Scarole, Cicorie (eccetto Witloof/Belgai):** 2,5 l/ha in pre-trapianto

**Carciofo:** 3 l/ha in pre-emergenza o pre-raccolto o, su coltura in vegetazione, solo nelle interfile e intorno ai capi.

**Leguminose (Fagioli e Fagiolini, Piselli, Fava, Favino, Cece, Lentischia, Vecchia, Lupino, Leguminose da foraggio):** 2,5 l/ha in pre-emergenza

**Sola:** 2,5 l/ha in pre-emergenza

**Girasole:** 3 l/ha in pre-emergenza

**Riso seminato in asciutta, compresi gli arginelli:** 2,5 l/ha in pre-emergenza

**Mais e Mais dolce:** 3 l/ha in pre-emergenza o post-emergenza (2 foglie)

**Sorgo:** 3 l/ha in pre-emergenza

**Cereali:** 2,5 l/ha in pre-emergenza o post-emergenza prima di inizio accostamento

**Tabacco:** 3 l/ha in pre-trapianto

**Tabacco per il controllo delle gemme ascellari:** applicare dopo l'eliminazione dell'infiorescenza. Depositare sulla cima di ciascuna pianta 20 ml di una soluzione precedentemente preparata diluendo 10 ml di CINDER per litro di acqua. Impiegare 400 l/ha di soluzione per impianti di 20000 piante/ha. Non spruzzare o nebulizzare il prodotto sulle piante. Il prodotto non deve entrare in contatto con le foglie.

**Tappeti erbosi:** il prodotto risulta selettivo a partire dal secondo anno di impianto su prati ben affrancati costituiti da specie graminacee quali ad esempio *Lolium perenne*, *Poa pratensis*, *Festuca* spp. e *Agrostis stolonifera* (quest'ultima purché mantenuta ad un'altezza di taglio superiore a 1,5 cm). Applicare 2,5 l/ha in post-emergenza.

**Piante ornamentali, Pioppo, Vivai:** 3 l/ha durante la fase di dormienza

- Riso: deve essere presente una fascia di rispetto vegetata non trattata di 20 metri dai corpi idrici superficiali, oppure deve essere presente una fascia di rispetto vegetata non trattata di 10 metri dai corpi idrici superficiali in combinazione con dispositivi che riducano la deriva del 50%.

- Agrumi, Pomacee, Drupacee, Frutta a guscio, Vite, Fragola, Patate, Carota, Aglio, Scalogno, Cipolla, Porro, Pomodoro, Melanzana, Peperone, Melone, Cavoli, Lattughe, Scarole, Cicorie, Carciofo, Leguminose, Soia, Girasole, Mais e mais dolce, Sorgo, Cereali, Tabacco, Tappeti erbosi. Piante ornamentali, Pioppo, Vivai: deve essere presente una fascia di rispetto vegetata non trattata di 20 metri dai corpi idrici superficiali, in combinazione con dispositivi che riducano la deriva del 50%.

in alternativa, per le colture Agrumi, Cereali, Tappeti erbosi, Piante ornamentali, Pioppo, Vivai la fascia di rispetto vegetata non trattata può essere ridotta a 10 metri dai corpi idrici superficiali, in combinazione con dispositivi che riducano la deriva del 75%.

**INFORMAZIONI PER IL MEDICO:** In caso d'intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

Consultare un CENTRO ANTIVELEMI.

**CARATTERISTICHE**

CINDER è un diserbante da distribuire sul terreno ove svolge la sua azione inibendo la germinazione dei semi e lo sviluppo dei germinali delle più importanti infestanti annuali, sia graminacee sia dicotiledoni. Le infestanti sono controllate anche nello stadio di pianta, purché le graminacee non abbiano superato lo stadio di 1-1,5 foglie e le dicotiledoni lo stadio di 2-3 foglie vere.

**INFESTANTI SENSIBILI:**

**GRAMINACEE:** *Digitaria sanguinalis* (sanguinella), *Panicum dactyloctenium* (giavone americano).

**DICOTILEDONI:** *Anagallis arvensis* (anagallide), *Lamium* spp. (falca critica), *Strepis arvensis* (Senape selvatica).

**INFESTANTI MODERATAMENTE SENSIBILI:**

**GRAMINACEE:** *Alopecurus myosuroides* (coda di volpe), *Echinochloa crus-galli* (giavone comune), *Setaria* spp. (pabbio) e *Sorghum halepense* (sovrghetta - da seme).

**DICOTILEDONI:** *Amaranthus* spp. (amaranto), *Chenopodium* spp. (farnello), *Papaver rhoeas* (papavero), *Metracaria chemomilla* (camomilla), *Polygonum* spp. (poligono), *Portulaca oleracea* (porcellana comune), *Senecio vulgaris* (setecione), *Solanum nigrum* (erba morella), *Urtica urens* (ortica), *Veronica* spp. (veronica).

**COLTURE, DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO**

Effettuare un solo trattamento per ciclo colturale impiegando volumi d'acqua compresi tra 200 e 400 l/ha. Non superare il dosaggio massimo indicato per ciascuna coltura. Il dosaggio indicato può essere ridotto su indicazione di un tecnico qualora il prodotto venga impiegato in miscela o in strategie di diserbo.

**Agrumi, Pomacee (Melo, Pero, Cotogno, Nespolo), Drupacee (Pesco, Nettare, Albicocco, Ciliegio, Susino):** 3 l/ha da post-

**CINDER**

DISERBANTE SELETTIVO PER IL CONTROLLO DI INFESTANTI ANNUALI GRAMINACEE E DICOTILEDONI  
 SOSPENSIONE ACQUOSA CONCENTRATA DI CAPSULE (CS)  
**MECCANISMO D'AZIONE: GRUPPO KI (HRAC)**

Registrazione n° XXXX del XXXXXXX del Ministero della Salute

**Composizione:**  
 100 g di prodotto contengono:  
 Pendimetalin, 34,8 g (e: 400 g/L)  
 Coformulanti q.b. a: 100



**INDICAZIONI DI PERICOLO: H410 -**  
 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

**ATTENZIONE**

**EJW401** - Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.  
**EJH208** - Contiene pendimetalin e 1,2-Benzisothiazolin-3-one. Può provocare una reazione allergica.

**CONSIGLI DI PRUDENZA: P102 -** Tenere fuori dalla portata dei bambini; **P381 -** Raccogliere il materiale fuoriuscito. **P501 -** Smaltire il prodotto/recipiente in un impianto d'eliminazione di rifiuti autorizzato in conformità alla regolamentazione nazionale.

**ADAMA AGAN L.Ltd**

P.O. B. 262 - 77100 Ashtod - ISRAELE

Rappresentata in Italia da:

**ADAMA Italia S.p.A.**

Via Zanica, 19 - 24050 Grassano (BG) Tel. 035328811

Stabilimento di produzione:

**ADAMA AGAN LTD-Industrial Zone**

P.O. Box 262, Ashtod 77102 - Israele

Stabilimento di confezionamento: I.R.C.A. Service SpA -24050

Fornovo S. Giovanni (BG)

Confezione: L 1,5-10-15-20

timbro


Partita n° vedi

**PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI:** Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. Dopo l'applicazione, non rientrare nell'area trattata prima che la vegetazione sia completamente asciutta.

Per proteggere gli organismi acquatici rispettare le seguenti misure di mitigazione.

"Etichette autorizzate con decreto dirigenziale del....."

11110.2017



una stratura profonda almeno 20 cm, la quale è sempre necessaria se si preferisce seminare barbabietola da zucchero o totetlo. Nessun rischio esiste per le successive colture da trapianto.

#### GESTIONE DELLE RESISTENZE

Per evitare l'insorgere di infestanti resistenti attenersi alle indicazioni riportate in etichetta impiegando il prodotto in miscela o in strategie di diserbo che includano prodotti a differente meccanismo d'azione e/o metodi agronomici, meccanici e fisici.

#### FITOTOSSICITÀ

Il prodotto svolge la sua azione a carico di semi e gemminelli localizzati nello strato superficiale del terreno. Pertanto, ai fini della selettività verso le colture da seme riportate in etichetta è indispensabile attenersi alle modalità e profondità di semina consigliate. Utilizzare le dosi inferiori in caso di impiego su terreni leggeri, filtranti e ricchi di scheletro. Nei trattamenti su carciofo, pisello o piante ornamentali assicurarsi che, direttamente o per deriva, il prodotto non giunga a contatto di foglie e di parti verdi o in accrescimento, soprattutto se formate da tessuti molto teneri. Il prodotto può essere fitotossico verso le colture non indicate in questa etichetta.

#### COMPATIBILITÀ

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

**Atterizione:** Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone e agli animali.

**NON APPLICARE CON I MEZZI AEREI  
OPERARE IN ASSENZA DIVENTO  
DA NON VENDERSI SFUSO  
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE  
ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE**

**IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO**

#### PREPARAZIONE DELLA MISCELA E ISTRUZIONI PER L'USO

Al fine di permettere al prodotto di esplicare al meglio la sua attività diserbante e la sua selettività verso le colture indicate, attenersi alle seguenti modalità operative:

- Preparare il letto di semina in modo da operare su terreno ben livellato e privo di zolle, tale da formare una massa uniforme e compatta, provvedendo altresì ad una irrigazione se non sopravviene una pioggia entro 7-10 giorni dal trattamento in modo da favorire la penetrazione del prodotto nello strato superficiale del terreno;
- Effettuare le semine in maniera uniforme e regolare ad una profondità di almeno 3 cm per carota, cipolla e riso e di 4 cm per le altre colture, avendo altresì cura di evitare che alcuni semi rimangano scoperti o a pelo di terra;
- Nel caso di colture trapiantate effettuare il trattamento sul terreno ben preparato facendo seguire subito dopo una leggera irrigazione ed attendendo almeno 7-8 giorni prima di procedere al trapianto, dopo il quale va somministrata un'altra leggera irrigazione; in nessun caso si debbono rincalzare le piantine prima che siano passati almeno 30 giorni dal trattamento;
- Nella generalità dei casi, al fine di ampliare lo spettro di azione sulle infestanti, si consiglia di impiegare CINDER in miscela con altri erbicidi;
- Nel caso di impianto di pioppi effettuare il trattamento dopo la crisi di trapianto verificando che la corteccia degli astoni nella zona del colletto sia integra e ben suberificata;
- Agitare accuratamente il prodotto prima dell'uso. Riempire il serbatoio dell'irroratore per il 50% del suo contenuto, versare in pronto e portare a volume mantenendo costantemente in agitazione;
- Distribuire la miscela operando uniformemente in modo da evitare lacune e sovrapposizioni;
- Quando si usa il prodotto in post-emergenza delle colture avere l'avvertenza di intervenire prontamente nei primissimi stadi di sviluppo ancora sensibili delle infestanti, come descritto sopra nelle caratteristiche del prodotto;
- Dopo la distribuzione lavare accuratamente con soluzione detergente tutte le attrezzature utilizzate per l'applicazione di CINDER. Assicurarsi che tutto il liquido venga rimosso dal serbatoio dell'irroratrice, dalla pompa e dalle tubature rimuovendo gli ugelli e aprendo gli scarichi del serbatoio e della pompa. Non riversare l'acqua di lavaggio nei canali delle acque reflue. I detergenti contaminati devono essere smaltiti in modo sicuro in conformità alle normative locali. Prima di iniziare a lavare leirroratrici leggere le istruzioni del produttore.

#### AVVERTENZE AGRONOMICHE

In caso di forzate risemie sui terreni già trattati con il prodotto evitare il contatto dei nuovi semi con il diserbante riseminando alle profondità suggerite senza rimuovere il terreno oppure effettuando

17A05973



11/08/2017

"Etichette autorizzate con decreto dirigenziale del....."